

Vegetal β etaphos

BIOATTIVATORE FOGLIARE DI
RADICAZIONE & FRUTTIFICAZIONE



**FONTE DI FOSFORO
ALTAMENTE DISPONIBILE
PER LE PIANTE**

PHY



**RIDUZIONE DELLA
SENSIBILITÀ AGLI STRESS
TERMICI**

BT



**AUMENTO DELLA
FOTOSINTESI E MAGGIORE
EFFICACIA DELLA
CONCIMAZIONE AZOTATA**

BT

AA



**INCREMENTO
DELL'EFFICIENZA
DEI NUTRIENTI**
[assorbimento e trasporto]

AA



**FONTI ENERGETICHE
PER LA PIANTA (ATP)**

PHY

AA



**REGOLAZIONE E
BILANCIAMENTO DELLO
SVILUPPO**
[radici, germogli, frutti]

PHY

AA

COMPOSIZIONE

	%
Sostanza Organica VEGETALE	30
Azoto [N] organico	3,5
Anidride Fosforica [P ₂ O ₅]	3
Ossido di Potassio [K ₂ O]	2,5
Carbonio [C] Organico di origine biologica	15
Acido Fitico	7,5
Acido L - Glutamico	1,5
Glicin Betaina	10

EPOCA & DOSI D'IMPIEGO - FOGLIARE

POMACEE	Da germogliamento a piena fioritura, 2-3 applicazioni	4 kg/ha
DRUPACEE	Da rottura gemme a inizio fioritura, 2 applicazioni	5 kg/ha
OLIVO	Sviluppo vegetativo sino a inizio fioritura, 2 applicazioni	6 kg/ha
ACTINIDIA	Da rottura gemme a inizio fioritura, 3 applicazioni	4 kg/ha
VITE	In pre-fioritura, 2 applicazioni	4 kg/ha
ORTAGGI DA FOGLIA	In post trapianto, 2-3 applicazioni in 12-15 giorni	6 kg/ha
ORTAGGI DA FRUTTO	Da post trapianto a pre-fioritura, 3-4 applicazioni	5 kg/ha
PATATA	Sviluppo vegetativo sino a pre-fioritura	6 kg/ha
COLTURE ORNAMENTALI	Da post trapianto a inizio sviluppo vegetativo	4 kg/ha

Possibile miscela con RAME e ZOLFO su POMODORO, VITE, OLIVO e CARCIOFO



Tanica 6kg



Tanica 25kg

